

■ **Neurochirurgie : 20 déclarations.**

■ *Chirurgie crânio-encéphalique (2) :*

- Exérèse d'un adénome hypophysaire (2) : cécité droite associée à une hémianopsie latérale gauche ; troubles visuels bilatéraux avec hydrocéphalie nécessitant la mise en place d'une valve.

■ *Chirurgie rachidienne (11) :*

Cure de hernie discale cervicale avec compression médullaire : quadriplégie post-opératoire partiellement régressive.

Cure de hernie discale lombaire (9) :

- syndrome de la queue de cheval lors d'une réintervention pour récurrence au bout de 5 ans ;
- hématome à J5 en rapport avec une hypoplaquettose révélant une dengue ;
- sepsis après réintervention à J10 pour récurrence ;
- amélioration puis récurrence douloureuse - réintervention pour exérèse d'un volumineux fragment ayant migré ;
- erreur d'étage ;
- mauvais résultat allégué (3 avec, dans un cas, critique de l'indication par un autre neurochirurgien).

Cure de hernie discale lombaire associée à un rétrécissement foraminaux : fistule entre l'artère iliaque droite et la veine iliaque gauche.

■ *Autres interventions (5) :*

- Cure de canal lombaire étroit (3) :
 - syndrome de la queue de cheval par hématome post-opératoire (2) ;
 - mauvais résultat allégué.
- Cure d'angiome vertébral : fuite de ciment en épidual - douleurs neuropathiques - neurostimulation épidurale transitoirement efficace.
- Chirurgie des nerfs périphériques : tuméfaction douloureuse de la face interne du bras gauche - découverte per-opératoire d'un schwannome - exérèse prudente mais paralysie totale du nerf médian.

■ *Accidents médicamenteux :*

- Corticoïdes après cure de hernie discale lombaire : péritonite par perforation d'un diverticule sigmoïdien.