

## ATTENTION VOUS ENTREZ DANS UNE ZONE DE DANGER !

Au cours d'une injection (vaccin ou autre) votre patient peut faire une réaction allergique

CECI EST UNE SITUATION A RISQUES

Se poser ces questions en termes de gestion des risques

---

### Barrières de prévention :

- Être conscient que ce risque existe et qu'il est nécessaire d'y être préparé
- Connaître les protocoles de prise en charge et disposer de ces protocoles par écrit
- Avoir à sa disposition un matériel en bon état de marche et dont la date de péremption doit être revue selon une périodicité fixe, déterminée à l'avance
- Disposer d'ampoules d'adrénaline
- Prévoir de garder en observation dans la salle d'attente le patient -pendant 15 minutes en cas de situation à risque identifiée (patient très allergique, vaccination Covid),

---

### Barrières de récupération

- En présence : D'un urticaire **ET** De troubles respiratoires (dyspnée, bronchospasme, hypoxémie) **OU** De troubles hémodynamiques (chute de la TA, syncope, hypotonie, vasoconstriction)
- Appeler le SAMU
  - Mettre le patient en position adaptée
  - Si dyspnée, position demi assise
  - Si malaise mais conservation de la conscience, décubitus dorsal, jambes surélevées
  - Si troubles de la conscience, position latérale de sécurité
  - Injecter de l'adrénaline
  - Injecter en IM, sur la face antéro-latérale de la cuisse, 0,01 mg /kg sans dépasser 0,5 mg (dose pour un patient adulte de poids 50 kg)

---

### Barrières d'atténuation

- Hospitaliser systématiquement le patient même en cas de régression totale de la symptomatologie
  - Déclarer l'accident allergique en cas de survenue après une vaccination anti Covid
- 

