

Cas clinique Prise de tension sur un bras atteint de lymphoedème

Téléchargez l'exercice

1. Lisez en détail le cas clinique,
2. Oubliez quelques instants cette observation et rapportez vous au tableau des barrières ù identifiez les barrières de Qualité et sécurité que vous croyez importantes pour gérer au plus prudent ce type de situation clinique. Le nombre de barrières n'est pas limité...
3. Interrogez le cas clinique avec les barrières que vous avez identifié en 2; ont-elles tenu ?
4. Analysez les causes profondes avec la méthode ALARM

BARRIERES DE PREVENTION	<i>Réalisé ou non pour le cas analysé</i>	<i>Force de la contribution (majeure, modérée, mineure)</i>
Nature de la barrière (une par ligne)		
BARRIERES DE RECUPERATION		
BARRIERE D'ATTENUATION		

Causes profondes

Pour la partie relevant de l'hôpital (méthode ALARM)		
	<i>Citer les éléments en faveur de ces causes profondes dans le cas étudié</i>	<i>Force de la contribution (majeure, modérée, mineure)</i>
Institutionnel (contexte économique réglementaire)		
Organisation (personnels et matériels, protocole)		
Environnement du travail (effectifs, charge de travail, maintenance, équipements)		-
Equipe (communication, supervision, formation)		
Individus (compétences individuelles)		

Ce matériel est réservé à un usage privé ou d'enseignement. Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une transaction commerciale

Tâches à effectuer (disponibilité et compétence)		-
Patients (comportements, gravité)		-
