

## La Prévention Médicale

### Retard de diagnostic d'une appendicite

Docteur Christian SICOT

### Analyse approfondie

<b>BARRIERES DE PREVENTION</b>		<i>Contribution relative</i>
Diagnostic en accord avec le tableau clinique	<p style="text-align: center;"><b>NON</b></p> <p>Après un diagnostic initial de « cruralgie », aucun diagnostic ne semble avoir été évoqué, et notamment pas celui de syndrome abdominal aigu, nécessitant un avis chirurgical.</p> <p>A noter, <b>l'absence de données dans le dossier médical</b>, sur l'examen clinique de la patiente (notamment, celui de l'abdomen).</p>	Important
Traitement prescrit adapté au contexte	<p style="text-align: center;"><b>NON</b></p> <p>Notamment, le Cortancyl utilisé de première intention, comme antalgique, pour soulager la douleur attribuée à la « cruralgie », a pu favoriser l'évolution vers une perforation appendiculaire.</p>	Important
Hospitalisation en cas de présomption de syndrome abdominal aigu (pour imagerie médicale et avis chirurgical)	<p style="text-align: center;"><b>NON</b></p> <p>Malgré l'aggravation des douleurs abdominales, la survenue de diarrhée, un pic fébrile à 39°C, l'hyperleucocytose et une CRP très augmentée.</p>	<b>Majeure</b>
Avis donné après interrogatoire et examen clinique de la patiente	<p style="text-align: center;"><b>NON</b></p> <p>La décision de « revoir lundi la patiente » a été prise après un simple entretien téléphonique avec son mari.</p>	<b>Majeure</b>
<b>BARRIERES DE RECUPERATION</b>		
Hospitalisation pour scanner abdomino-pelvien et avis chirurgical	<p style="text-align: center;"><b>OUI</b></p> <p>A la suite de l'appel du SAMU par le mari de la patiente mais 12 jours après le début des symptômes et 48 heures après les résultats biologiques imposant une hospitalisations d'urgence.</p>	
<b>BARRIERE D'ATTENUATION</b>		
Intervention chirurgicale d'urgence, dès l'hospitalisation et les données du scanner abdomino-pelvien	<p style="text-align: center;"><b>OUI</b></p> <p>Mais avec nécessité d'une résection de 40 cm d'iléon associée à une colectomie droite.</p>	Aggravation d'une diarrhée chronique antérieure