

"Complication mortelle inattendue après un prolapsus utérin
chez une vache charolaise"

par le Dr Michel Baussier, Docteur vétérinaire

Tableaux d'analyse des barrières

Ce matériel est réservé à un usage privé ou d'enseignement.

Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une transaction commerciale

| Barrières de prévention | Réalisée ou non dans le cas d'espèce | Contribution relative à l'EIG |
|---|---|---|
| Animaux de l'élevage vaccinés contre les infections à germes anaérobies. | Non (mal vaccinés car éleveur opposé aux vaccins). | Oui, très vraisemblable. |
| A l'approche du part, l'animal est isolé dans un box de vêlage. | Non, pas de box de vêlage disponible dans cette exploitation. | Oui, par déficit d'hygiène et de soins. |
| Le praticien a fait diligence pour intervenir. | Oui. | Non. |
| La délivrance manuelle est possible. | <ul style="list-style-type: none"> • Non, lors de la première intervention. • Oui, lors de la seconde intervention. | Non. |
| Chacune des deux interventions est réalisée sous anesthésie épidurale. | Oui. | Non. L'anesthésie s'était montrée efficace contre les efforts expulsifs lors de la 1 ^{ère} intervention ; moins lors de la 2 ^e intervention. |
| Un bouclement vulvaire est effectué lors de chacune des deux interventions successives. | Oui. | Indispensable. Mais vraisemblable et inévitable contribution à l'EIG (ischémie, nécrose) sous l'effet des efforts expulsifs. |
| Mise en place de mesures antiseptiques locales et mise en place d'un traitement anti-infectieux général. | Oui. | Non. |
| Barrières de récupération | Réalisée ou non dans le cas d'espèce | Contribution relative à l'EIG |
| Prescription et administration parentérale d'un sédatif (Rompun, ND) et d'un antispasmodique (Estocelan, ND). | Oui. | A fait disparaître les efforts expulsifs. Aurait pu contribuer à récupérer la situation. |

| Barrières d'atténuation | Réalisée ou non dans le cas d'espèce | Contribution relative à l'EIG |
|--|---|--|
| Traitement local et général de la gangrène vestibulo-vulvaire. | Oui. Toutefois soins locaux mal pratiqués par l'éleveur. | Non. L'évolution fatale n'a toutefois pas pu être évitée. |

Tableaux d'analyse des causes

| Nature de la cause | Faits en faveur de cette analyse | Contribution relative |
|---|---|-----------------------|
| Défauts de compétences techniques du praticien | Réduction effectuée selon les règles de l'art. | Néant |
| Défauts de compétences non techniques du praticien | Déficit d'explications (justifications) sur la méthode employée ? Discutable. | Néant |

Tableaux d'analyse détaillée selon la méthode des tempos

| Détail des défauts de compétences non techniques | Faits en faveur de cette analyse | Contribution relative |
|--|--|-----------------------|
| Tempo de l'affection (éléments liés à l'évolution non standard) | Persistance anormale des efforts expulsifs. (la cause n'a pas été déterminée avec certitude dans le cas de figure). | Essentielle |
| Tempo du traitement mis en œuvre | Pas de particularité. | Néant |
| Tempo de l'éleveur (éléments liés à leur comportement) | Manque d'hygiène du vêlage, favorable à l'infection post-partum. Soins locaux prescrits mal effectués. | Importante |
| Tempo du praticien (Eléments liés à ses attitudes et au choix non consenti du mode opératoire) | A joué dans la crise relationnelle mais aucunement sur le déroulement inhabituel du vêlage et de ses suites. | Accessoire |