

Tableau d'analyse approfondie des barrières

Ce matériel est réservé à un usage privé ou d'enseignement.

Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une transaction commerciale

BARRIERES DE PREVENTION		Contribution relative
Antibiotique choisi efficace	OUI 1-Dans le traitement des infections bucco-dentaires (notamment abcès parodontal) Mais 2-Efficacité non démontrée dans la prévention des endocardites infectieuses lors de valvulopathie (cas de la patiente)	Sans objet (dans l'observation)
Absence de contre-indication chez la patiente, de l'antibiotique choisi	NON L'antibiotique prescrit contenait un macrolide (spiramycine) susceptible d'allonger l'intervalle QT chez la patiente, qui prenait de l'amiodarone également capable d'allonger l'intervalle QT, une telle association pouvait provoquer un trouble du rythme cardiaque grave <i>Voir Commentaire</i>	MAJEURE
Prise en charge du médecin traitant adaptée au contexte (vertige avec chute de la PA au lever de la table)	NON , car interrogatoire et examen incomplets 1-antécédents médicaux récents ? 2-Médicaments actuellement et récemment pris ? 3-Fréquence et régularité du rythme cardiaque ?... Mais, d'après les dires du médecin traitant, sa prise en charge de la patiente n'était pas terminée lorsqu'il l'a laissée en salle d'attente	IMPORTANTE
Réalisation en urgence d'un ECG (soit sur place, soit par transfert aux urgences de la clinique cardiologique ou du centre hospitalier) pour rechercher un éventuel trouble du rythme et le corriger	NON , malgré la survenue d'un malaise inexplicé Mais même remarque que précédemment	MAJEURE

BARRIERES DE RECUPERATION		
Appel téléphonique de la patiente sur son portable (ou à son domicile) par le médecin traitant, dès la constatation de son départ de la salle d'attente, pour l'informer de la nécessité de réaliser, en urgence, un ECG (clinique cardiologique, centre hospitalier)	NON	MAJEURE
BARRIERE D'ATTENUATION		
Sans objet	Patiente retrouvée en arrêt cardiaque sur le sol de sa salle de bain (Réanimation cardio-respiratoire inefficace)	Décès

Tableau d'analyse détaillée des causes profondes

Nature de la cause	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Défaut de compétence technique (Compétence pure)	Interrogatoire incomplet 1-Antécédents médicaux récents ? 2-Médicaments actuellement et récemment pris ?	IMPORTANTE
	Examen incomplet 1-Fréquence et régularité du rythme cardiaque 2-Chiffres de PA avant et après le malaise	IMPORTANTE
	Non-prescription d'un ECG chez cette patiente cardiaque traitée par un antiarythmique (amiodarone) et ayant fait un malaise inexplicé	MAJEURE
	Mais, d'après les dires du médecin traitant, sa prise en charge de la patiente n'était pas terminée lorsqu'il l'a laissée en salle d'attente...	MAJEURE
Défauts de compétences non techniques (Compétences dans la gestion des tempos et des aspects non médicaux)	<ul style="list-style-type: none"> • Retour de la patiente à son domicile sans autorisation de son médecin • Interruption momentanée de la prise en charge de la patiente par son médecin pour éviter une attente excessive aux patients ayant pris auparavant rendez-vous • Prescription par le chirurgien-dentiste d'un antibiotique contre-indiqué chez la patiente • Traçabilité des facteurs de risques de la patiente par le chirurgien-dentiste ? • Information du patient concernant les effets indésirables liés à son traitement, à la prudence lors d'associations médicamenteuses 	MAJEURE MAJEURE
	Détail des défauts de compétences non techniques	La procédure d'analyse des tempos peut se retrouver dans le guide d'analyse des incidents accessible sur le site de la Prévention Médicale

<p>Tempo de la maladie (Éléments liés à l'évolution non standard de la pathologie)</p>	<p>NON L'allongement de l'intervalle QT est une complication rare des traitements médicamenteux, mais facile à diagnostiquer en réalisant un ECG <i>Voir Commentaire</i></p>	
<p>Tempo du patient (Éléments liés aux décisions du patient)</p>	<p>OUI La patiente est rentrée à son domicile sans que le médecin l'y ait autorisée alors que la consultation n'était pas terminée. Elle n'a pas évoqué auprès de son chirurgien-dentiste son malaise chez son médecin traitant, ni reparlé de son traitement en cours.</p>	<p>MAJEURE</p>
<p>Tempo du cabinet (Éléments liés à l'organisation du travail au cabinet)</p>	<p>OUI La patiente a été vue sans rendez-vous par son médecin, augmentant l'attente des autres patients qui avaient pris rendez-vous. Le malaise inexplicable survenu chez elle exigeait que la consultation aille jusqu'à son terme, avec une prescription conforme au contexte (ECG en urgence)</p>	<p>MAJEURE</p>
<p>Tempo du système médical (Éléments liés aux temps nécessaires pour obtenir les articulations nécessaires avec les autres professionnels de santé)</p>	<p>OUI Non-respect de la contre-indication de l'antibiotique prescrit (spiramycine) chez la patiente par le chirurgien-dentiste <i>Voir Commentaire</i></p>	<p>MAJEURE</p>