

## Oubli d'instruments en chirurgie obstétricale rurale :

### >> Une pince hémostatique retrouvée dans l'utérus d'une vache après césarienne

par le Dr Vre Michel Baussier



### Analyse des barrières

*Ce matériel est réservé à un usage privé ou d'enseignement.*

*Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une transaction commerciale*

Barrières de prévention	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Praticien formé et expérimenté	<b>Oui</b>	<b>NON</b>
Bonnes conditions opératoires	Les conditions sont bonnes mais pas optimales, la position n'étant pas la plus confortable pour le praticien.	<b>Petite contribution possible</b>
Bon contrôle visuel lors de la suture utérine	Pas forcément optimal.	<b>Petite contribution possible</b>
Praticien reposé	Pas vraiment en saison obstétricale intense.	<b>Possible</b>
Barrières de récupération	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Lors du deuxième appel, l'animal a été référé pour option chirurgicale	<b>Oui</b> Mais pas exploité de façon rationnelle et poussée.	<b>+++</b>
Barrières d'atténuation	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Le traitement chirurgical a été tenté (dans les 24 heures)	Aucune atténuation en l'absence de signaux à court terme. Irréversibilité du processus au moment du constat.	<b>OUI</b>

### Analyse des causes

Nature de la cause	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
<b>Défauts de compétences techniques du praticien</b>	Néant.	<b>Nulle</b>
<b>Défauts de compétences non techniques du praticien</b>	Fatigue du chirurgien et conditions opératoires imparfaites.	<b>Probable</b>

## Analyse détaillée selon la méthode des tempos

Détail des défauts de compétences non techniques	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
<b>Tempo de la technique usuelle</b>	Abord par le creux du flanc habituellement bien maîtrisé sur vache debout, peut-être moins optimal sur animal couché.	<b>Possible</b>
<b>Tempo de l'animal</b> (Éléments liés à son comportement)	Parturiente fatiguée par efforts expulsifs précédents amenant à opter pour intervention sur animal couché en position quasi-physiologique.	<b>Petite contribution possible</b>
<b>Tempo du praticien</b> (Éléments liés à ses attitudes et au choix du mode opératoire)	Praticien aguerri mais fatigué.	<b>Contribution possible</b>