

Par Candice LHAUTE – Sage-femme

Tableau d'analyse des causes profondes

Ce matériel est réservé à un usage privé ou d'enseignement.

Il reste la propriété de la Prévention Médicale et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une transaction commerciale

Facteurs de la grille ALARM	Éléments de contexte – Causes identifiées
Facteurs liés au patient	<ul style="list-style-type: none">• Nécessité de déclencher le travail dans un contexte de fissuration de date indéterminée.• Risque infectieux augmenté pour le fœtus avec potentielle moins bonne tolérance du travail.
Facteurs liés aux tâches à accomplir	<ul style="list-style-type: none">• La sage-femme ne consulte pas le protocole disponible pour l'administration de Syntocinon®.• Elle prescrit la bonne dose mais ne vérifie pas le débit d'administration et l'unité sur l'écran du pousse seringue.
Facteurs liés à l'individu (professionnel)	<ul style="list-style-type: none">• La sage-femme est intérimaire et n'est pas familière du protocole de la maternité ni du matériel utilisé.• La sage-femme n'ose pas demander de l'aide à une collègue.
Facteurs liés à l'équipe	<ul style="list-style-type: none">• Bonne communication entre les différents corps de métier : le médecin arrive rapidement et c'est lui qui constate l'erreur et le signale à la sage-femme = pas de facteurs contributifs.
Facteurs liés à l'environnement de travail	<ul style="list-style-type: none">• Charge de travail importante.
Facteurs liés à l'organisation et au management	<ul style="list-style-type: none">• Intérimaire positionnée en salle d'accouchement, service d'urgence, au lieu d'un service d'hospitalisation (d'autres sages-femmes fixes sur place disponibles pour basculer en SDN).
Facteurs liés au contexte institutionnel	<ul style="list-style-type: none">• Maternité en sous-effectif constant, faisant très fréquemment appel à l'intérim : erreurs potentiellement reproductibles.