

Pour la partie relevant de l'hôpital (méthode ALARM)		
Nature de la cause	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Institutionnel (contexte économique réglementaire)	-Non	
Organisation (personnels et matériels, protocole)	<p>- Absence d'information sur le système de garde de la clinique: Qui prévenir? Anesthésiste ou chirurgien? Garde sur place ou astreinte à domicile ?</p> <p>-Absence de protocole concernant la surveillance des opérés : paramètres à surveiller, périodicité, niveau d'alerte, médecin à prévenir.</p>	<p>Importante Si absence de garde sur place</p> <p>Faible Compte-tenu de l'absence de réactivité du chirurgien et de l'anesthésiste devant l'état de la malade lors de la matinée du 12 février (1)</p>
Environnement du travail (effectifs, charge de travail, maintenance, équipements)	NON	
Equipe (communication, supervision, formation)	<p>-Défaut de supervision et de formation de l'équipe soignante de nuit pour assurer la surveillance des opérés : →Absence d'appel du médecin de garde malgré l'installation d'un état de choc aboutissant à la perte de conscience de la patiente sans appel du médecin de garde</p>	Majeure
Individus (compétences individuelles)	<p><u>Chirurgien</u> -absence de conversion en laparotomie malgré les difficultés rencontrées en peropératoire</p> <p>- absence d'organisation d'une surveillance adaptée au dépistage précoce d'un risque (prévisible) de perforation intestinale</p> <p>-absence de prise en charge rapide et adaptée (réintervention, dès J1, (éventuellement précédée d'un scanner abdominal), malgré un tableau évocateur de perforation intestinale</p> <p><u>Anesthésiste</u> -absence de prise en charge rapide et adaptée dès J1, (voir plus haut)</p> <p><u>Equipe infirmière de nuit</u> (voir paragraphe " Equipe ")</p>	<p>MAJEURE</p> <p>Majeure</p>

		Majeure
Tâches à effectuer (disponibilité et compétence)	<i>Voir paragraphe précédent et paragraphe " Organisation "</i>	
Patients (comportements, gravité)	<i>Obésité importante et antécédents de plusieurs interventions abdominales entraînant</i> <i>- soit un risque de complication pariétale infectieuse (en cas de laparotomie)</i> <i>-soit un risque de perforation intestinale (en cas de cœlioscopie)</i>	Importante