

Barrières de prévention	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative
Appel précoce du vétérinaire par l'éleveur	Non (la vache présentait des efforts expulsifs depuis plusieurs heures, sinon la veille)	Assez importante + (contribution à l'œdème et autres lésions du col et ses conséquences : efforts expulsifs et propension au décubitus)
Diagnostic rapide du caractère irréductible de la torsion utérine	Non (d'abord tentative de réduction manuelle puis tentative en roulant la vache, méthode dépassée)	Assez importante ++ (contribution idem supra)
Choix de la technique chirurgicale : -vache couchée : -vache debout :	Non Oui	Discutable Pas de chute possible mais efforts expulsifs accrus. Accroît le risque de décubitus incontrôlé, diminue celui d'efforts expulsifs.
Anesthésie épidurale basse	Non	Discutable (le plus efficace pour supprimer les efforts expulsifs mais dosage délicat en pratique pour garantir la station debout)
Administration parentérale d'antispasmodiques utérins ou de tocolytiques	Non	Modérée à nulle
Sédation (spécialité à base de xylazine en IV)	Oui (justifiée par l'agitation et l'agressivité de l'animal ; mais dose un peu élevée)	Assez importante + (favorise la chute, ne réduit pas les efforts expulsifs)
Tentative brève de réduction de la torsion utérine par laparotomie avant hystérotomie	NON, les essais ont duré <u>trop longtemps</u> , ils sont à l'origine de la recrudescence des efforts expulsifs et de l'affaissement de l'animal.	MAJEURE +++
Barrières de récupération		

<p>Maîtriser le décubitus de l'animal (décubitus droit et non décubitus gauche) par la bonne orientation de l'encolure de l'animal : rôle déterminant et relativement aisé de l'aide opératoire qui est à la tête.</p>	<p>Non : personne inefficace (propriétaire de l'animal), ne respectant pas les consignes données par le praticien ; son dilettantisme avait déjà été précédemment à l'origine du coup de pied reçu par le praticien)</p>	<p>MAJEURE ++</p>
<p>Barrières d'atténuation</p>		
<p>Décision de ruminotomie pour vidange du contenu stomacal permettant le repositionnement des viscères digestifs</p>	<p>Oui (bonne décision)</p>	
<p>Repositionnement de l'animal en décubitus droit, nettoyage des viscères souillés, achèvement de l'hystérotomie et de l'extraction du fœtus mort, sutures, antibioprofylaxie</p>	<p>Oui (bonne décision)</p>	<p>L'animal est mort de choc hémorragique en fin d'intervention.</p>