

ANALYSE DES BARRIERES

BARRIERES DE PREVENTION		Contribution relative
En cas de prescription d'un médicament dont le médecin n'a pas l'expérience, celui-ci doit vérifier dans le RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit): ses indications, ses contre-indications, sa voie d'administration, sa posologie (dose unitaire, nombre de prises quotidiennes, horaire des prises) ainsi que la durée du traitement	-NON,	MAJEURE
En cas de prescription du méthotrexate (ANSM 2016): → mentionner systématiquement sur l'ordonnance et de manière bien visible le jour de la semaine où le médicament doit être pris. Ce dernier doit être déterminé avec le patient afin d'éviter toute confusion → porter une attention particulière aux patients âgés et/ou présentant des troubles cognitifs du fait du risque plus important de confusion.	-NON Ces règles sont récentes mais l'Afssaps avait, dès 2007, publié des recommandations allant dans le même sens	MAJEURE
BARRIERES DE RECUPERATION		
Avant de délivrer ,un médicament signalé comme "à risque", le pharmacien doit prendre connaissance du dossier médical du patient et, dès lors qu'il a un doute sur un risque couru par le patient, prendre contact avec le médecin prescripteur	-NON,	MAJEURE
En cas de prescription de méthotrexate, il est recommandé (ANSM 2016) : Aux pharmaciens d'officine →De s'assurer que le patient comprend les modalités de prise du méthotrexate, et notamment sa fréquence. →D'indiquer sur le feuillet destiné au patient (téléchargeable sur internet) et sur la boîte le jour de prise et lui remettre le feuillet à chaque délivrance Aux pharmaciens d'établissements de santé : →De diffuser aux services de soins, à chaque dispensation de méthotrexate, le feuillet ¹ destiné aux établissements de santé (téléchargeable sur Internet).		Sans objet Compte-tenu de la date de parution de ces recommandations
Remarques faites au médecin par les infirmières chargées d'administrer le méthotrexate, Sur la périodicité de sa prescription quotidienne et non pas hebdomadaire	OUI Mais absence de prise en compte de ces remarques par le médecin	
Rectification par la patiente de l'erreur de périodicité faite par le médecin prescripteur en rétablissant la prise de méthotrexate à 1 jour par semaine	NON, vraisemblablement en raison des troubles cognitifs récemment apparus chez elle	Importante
BARRIERE D'ATTENUATION		

<i>Hospitalisation de la patiente</i>	<i>-OUI Mais tardive dans un tableau d'aplasie médullaire fébrile, après 15 jours d'administration quotidienne de méthotrexate</i>	<i>Décès au 9ème jour d'hospitalisation</i>
---------------------------------------	--	---