

« Hématome sous-dural chez un patient traité par AVK »

Dr Christian SICOT.

Analyse selon la méthode des tempos

(La procédure d'analyse en tempos peut se retrouver dans le guide d'analyse des incidents accessible sur le site Prévention Médicale)

Tempo de la maladie (Éléments liés à l'évolution non standard de la pathologie)	NON, <i>Les recommandations à mettre en œuvre sont simples en cas de surdosage en AVK (dans le cas du patient, arrêt AVK, administration de vitamine K et hospitalisation) (voir Commentaire)</i>	Majeur
Tempo du patient (éléments liés aux décisions du patient)	OUI, <i>A priori, patient peu informé des conditions pour assurer l'efficacité et la sécurité de son traitement par AVK (INR cible à 2,5 avec une fenêtre comprise entre 2 et 3), comme en témoignent</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>l'INR à 1,26 Le 5 juillet (urgences)</i>• <i>l'INR, à 10,4 le 20 juillet</i>	Important
Tempo du cabinet (éléments liés à l'organisation du travail au cabinet)	NON	
Tempo du système médical (éléments liés aux temps nécessaires pour obtenir les articulations nécessaires avec les autres professionnels de santé)	OUI <ul style="list-style-type: none">• <i>Sur l'ordonnance rédigée par l'interne, date de contrôle de l'INR trop éloignée compte –tenu que l'INR (3,02) était, déjà, au-dessus de la fenêtre supérieure, le jour de sortie de la clinique</i>• <i>Absence d'hospitalisation par le médecin régulateur du SAMU le 23 juillet d'un patient saignant sous anticoagulant</i>	Majeure Majeure